


Orientações sobre a prescrição de Liraglutida no CEAFF-DF

- **Fármaco:** LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML



- Alphalinc: 27795 - LIRAGLUTIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML MULTIDOSES DE ATÉ 3,0 MG (INDICAÇÃO: CONTROLE DE PESO)

- Excipientes: fosfato de sódio dibásico di-hidratado, propilenoglicol, fenol, hidróxido de sódio (ajuste de pH), ácido clorídrico (ajuste de pH) e água para injetáveis.

- A liraglutida é um agonista do receptor de GLP-1 (peptídeo símile ao glucagon humano 1) produzido por tecnologia de DNA recombinante em *Saccharomyces cerevisiae*.

- A caneta tem total de 18 mg (6 mg/ml x 3 ml) e é graduada partindo de 0,6 mg até 3,0 mg, escalonada de 0,6 em 0,6 mg.

- **Posologia:** A dose inicial diária para todos os pacientes é de 0,6 mg e deve ser aumentada para 3,0 mg em incrementos de 0,6 mg com intervalos de pelo menos uma semana (exemplo: 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 e 3,0 mg). Doses diárias maiores que 3 mg não são recomendadas.

- **Dose máxima:** 3,0 mg/dia

- **Agulhas:** 192583 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5 MM X 0,25 MM

- Mesma agulha da caneta de insulina

- Pode ser administrado com agulhas com até 8 mm de comprimento

- **Tempo máximo de tratamento:** 24 meses (Nota Técnica nº 1/2024 - SEI 130961427):

- **Tratamento:**

- A titulação da dose deverá respeitar o intervalo mínimo de sete dias. Intervalos maiores poderão ser utilizados, a critério do médico assistente, conforme resposta terapêutica ou perfil de efeitos colaterais apresentados pelo paciente. Por este motivo, não se recomenda o preenchimento da LME com quantitativo de canetas para o 4º, 5º e 6º mês antes do escalonamento dos primeiros 3 meses e verificar a resposta obtida pelo paciente.



● **Preenchimento LME:**

- Devido ao escalonamento de dose da Liraglutida, o preenchimento do primeiro LME contemplará somente os primeiros 3 meses de tratamento, sendo necessário a renovação do segundo trimestre no início do quarto mês com a apresentação de novo LME e nova receita médica. Após esse período, uma vez já estabilizada a dose do paciente, os LME poderão ser preenchidos para os tratamentos semestrais até completar os 24 meses de tempo máximo.
- O prescritor poderá optar por qual modelo de escalonamento se adapte melhor ao tratamento. No intuito de auxiliar no cálculo do número de canetas a ser dispensado ao paciente conforme escalonamento escolhido, seguem as sugestões:

■ **Escalonamento Mensal:**

Paciente que utiliza 0,6 mg/dia = 18,6 mg/mês = 2 canetas no primeiro mês

Paciente que utiliza 1,2 mg/dia = 37,2 mg/mês = 2 canetas no segundo mês

Paciente que utiliza 1,8 mg/dia = 55,8 mg/mês = 4 canetas no terceiro mês

Paciente que utiliza 2,4 mg/dia = 74,4 mg/mês = 4 canetas no quarto mês

Paciente que utiliza 3,0 mg/dia = 93 mg/mês = 5 canetas no quinto mês

Paciente que utiliza 3,0 mg/dia = 93 mg/mês = 5 canetas no sexto mês

➤ Preenchimento do Primeiro LME (1º trimestre):

Medicamento	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	2	2	4	0	0	0

■ **Escalonamento Quinzenal**

Paciente que utiliza 0,6 mg na 1ª quinzena (15 dias): 9 mg

Paciente que utiliza 1,2 mg na 2ª quinzena (16 dias): 19,2 mg

Total Mês 1: 28,2 mg/mês = 2 canetas



Paciente que utiliza 1,8 mg na 1ª quinzena (15 dias): 27 mg

Paciente que utiliza 2,4 mg na 2ª quinzena (16 dias): 38,4 mg

Total Mês 2: 65,4 mg/mês = 4 canetas

Paciente que utiliza 3,0 mg a partir do 3º mês: 93 mg/mês = 5 canetas

➤ Preenchimento do Primeiro LME (1º trimestre):

Medicamento	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	2	4	5	0	0	0

■ **Escalonamento Semanal:**

Paciente que utiliza 0,6 mg na 1ª semana: 4,2 mg

Paciente que utiliza 1,2 mg na 2ª semana: 8,4 mg

Paciente que utiliza 1,8 mg na 3ª semana: 12,6 mg

Paciente que utiliza 2,4 mg na 4ª semana: 16,8 mg

Paciente que utiliza 3,0 mg na 5ª semana (residual de 3 dias): 9 mg

Total Mês 1: 51 mg/mês = 3 canetas

Paciente que utiliza 3,0 mg a partir do 2º mês: 93 mg/mês = 5 canetas

➤ Preenchimento do Primeiro LME (1º trimestre):

Medicamento	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	3	5	5	0	0	0

OBS: para o primeiro semestre de tratamento deverão ser apresentados LME, receita, relatório padronizado, exames e documentação pessoal para a autorização do primeiro trimestre (1º, 2º e 3º mês)



de tratamento). Para a autorização dos próximos trimestres (4º, 5º e 6º mês de tratamento), o paciente deverá apresentar novo LME e receita com a dose terapêutica atualizada indicada pelo médico assistente. Tal medida se dá devido à necessidade de escalonamento da dose no início do tratamento.

Exemplo: no caso da escolha médica ser escalonamento semanal:

Preenchimento do 1º LME:

Medicamento	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	3	5	5	0	0	0

Hipótese: na avaliação médica de seguimento foi constatado que na dose de 1,8 MG o paciente obteve perda ponderal importante, sendo definida esta como a dose terapêutica. Neste caso: 1,8 mg/dia x 30 dias = 54 mg/mês : 18mg/caneta = 3 canetas/mês.

Uma vez que o paciente deverá ser avaliado quanto aos critérios de continuidade com 6, 12 e 18 meses, o preenchimento da 2ª LME deverá ser:

Medicamento	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	3	3	3	0	0	0

Para a manutenção do tratamento o preenchimento da LME deverá ser:

Medicamento	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	3	3	3	3	3	3

Sempre que houver alteração de dose que necessite de quantidade diferente de canetas por mês, o paciente deverá apresentar novo LME e receita com a atualização do tratamento.



- Exames a serem apresentados de acordo com o caso clínico do paciente:

