



## Da preparação à aplicação da vacina contra VSR em 6 passos

1

Retire a tampa superior (cor roxa) da embalagem do frasco-ampola do diluente da vacina e aspire todo o conteúdo (0,78 mL) utilizando a seringa de 1 mL acoplada à agulha 25x6.

2

Retire a tampa superior (cor azul clara) da embalagem do frasco-ampola do pó liofilizado e injete todo o diluente aspirado neste recipiente, utilizando o mesmo conjunto de seringa-agulha usado no passo anterior.

3

Iguale a pressão do frasco antes de retirar a agulha do batoque, aspirando ar para dentro da seringa de diluição vazia, a fim de evitar dispersão da vacina no ambiente.

4

Proceda com a diluição do conteúdo fazendo movimentos circulares suaves até que o pó esteja completamente dissolvido (menos de 1 minuto). Não agite!

5

A vacina preparada é uma solução límpida e incolor. Inspecione visualmente a vacina antes da administração e não a use se forem encontradas partículas grandes ou descoloração.

6

Retire uma dose única do frasco-ampola, correspondente a 0,5 mL\* e proceda com a aplicação na gestante via intramuscular, utilizando a técnica em Z para melhor absorção do imunizante e diminuição dos ESAVI locais.

\*O volume excedente deverá ser desprezado.

